

ANBAUEMPFEHLUNG

SOMMERGERSTE IN HERBSTAUSSAAT - EXCALIBUR

Nach ersten Erfahrungen eignet sich die Sommergerste EXCALIBUR zur späten Herbstsaat in wintermilden Lagen.

SAATTERMIN

-  Niederungslagen: frühestens ab ca. 30.10. bis **05.11.** bis Ende November/Mitte Dezember
-  Höhenlagen: frühestens ab ca. 20.10. bis **25.11.** bis Ende November (ab ca. 250m ü N.N)
-  Das Saatbeet gibt den Saattermin vor!
-  Bei zu nassen Bodenbedingungen ist die Aussaat auf einen späteren Termin zu verschieben oder erst im Frühjahr zu säen! Ein zu feuchtes Saatbett wirkt sich negativ auf den Ertrag aus.

SAATSTÄRKE

Saattermin oder Zustand des Saatbetts anwenden

	Niederungslagen:	Ende Okt./gutes Saatbett	240 – 260 Kö/m ²
		Mitte Nov./normales Saatbett	260 – 280 Kö/m ²
		Anfang Dez./(schlechtes) Saatbett	280 – 310 Kö/m ²
	Höhenlagen:	Mitte Okt./gutes Saatbett	250 – 270 Kö/m ²
		Anfang Nov./normales Saatbett	270 – 290 Kö/m ²
		Ende Nov./(schlechtes) Saatbett	300 – 320 Kö/m ²

WACHSTUMSREGLER

-  Aufgrund kurzer Wuchshöhe und sehr guter Standfestigkeit sind geringe Mengen meist ausreichend
-  Bei sehr hoher Ertragserwartung (>9 t) sind mittlere Mengen ausreichend

DÜNGUNG

Ertragserwartung von 7-9 to/ha:

insgesamt ca. **150 kg - 170 kg N/ha** inkl. N-min.
 in 2 Gaben:

- 🌾 60-80 kg N/ha zu Vegetationsbeginn
- 🌾 40-60 kg N/ha bei Schossbeginn (EC 30-31)

Ertragserwartung über 9 to/ha:

ca. **170 kg - 190 kg N/ha** inkl. N-min. in 2-3 Gaben:

- 🌾 60-80 kg N/ha zu Vegetationsbeginn
- 🌾 40-60 kg N/ha bei Schossbeginn (EC 30-31)
- 🌾 evtl. Nachlage in EC 39 mit 20 kg N/ha flüssig mit Fungizid kombiniert, um bei hoher Ertragserwartung das RP abzusichern.

- 🌾 **zu geringe Stickstoffmengen** können dazu führen, dass der Proteingehalt im Korn unter den für Braugerste geforderten Wert von 9,5 % sinkt. **Eine Stickstoffgabe von 110 – 130 kg N/ha ist anzustreben.**

- 🌾 **Immer aktuelle Düngeverordnung beachten!**

PFLANZENSCHUTZ

- 🌾 **Herbizide:** Analog zu Wintergerste, alle Pflanzenschutzmittel, welche in Wintergerste zugelassen sind, dürfen auch in Sommergerste, die im Herbst gesät wurde, angewendet werden.
- 🌾 **CTU/Prosulfocarb-Mischungen können zu Schäden führen.**
- 🌾 **Gelbverzwergungsvirus (BYDV):** Bei warmer Witterung sowie bei frühen Saatterminen, Bestand auf **Blattlaus- und Zikadenbefall** kontrollieren. Bei Überschreiten der Schadschwellen wird empfohlen ein geeignetes Insektizid einzusetzen.
- 🌾 **Fungizide:** Der Bestand ist zu Vegetationsbeginn und fortlaufend des Wachstums zu kontrollieren. Bei Überschreiten der Schadschwellen ist der Einsatz geeigneter Fungizide ratsam. Hauptaugenmerk sollte auf den Befall mit **Netzflecken** und **Rhynchosporium** gelegt werden.
- 🌾 Wenn der Blattapparat voll entwickelt ist bietet sich die Absicherung gegenüber **Ramularia** mit einem geeigneten Fungizid an.
- 🌾 Zur Absicherung von Ertrag und Qualität kann eine Beizung mit **Fluxapyroxad** sinnvoll sein.



EXCALIBUR

Hauptsaaen Seed & Service GmbH | Gaedestraße 9 | 50968 Köln | Tel.: 0221/16381120 |
 E-Mail: info@hauptsaaen.de

Alle Darstellungen erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen, aber ohne Gewähr. Trotzdem hängt der Erfolg der Kultur unter Praxisbedingungen auch von unsererseits nicht beeinflussbaren Faktoren ab, die nichts mit der Qualität und Leistungsfähigkeit der Sorte zu tun zu haben. Eine Gewähr oder Haftung können wir daher nicht übernehmen. Daten und Kenntnisstand 08 / 2026

über
135 JAHRE
 HAUPTSAATEN

www.hauptsaaen.de