ACKERBOHNE

# MYSTIC

## DER GEHEIMTIPP ZUM ERFOLG

VICINARM | TROCKEN TOLERANT | QUALITÄT | ÖKO EIGNUNG

- Hohe Kornerträge
- Früher Blühbeginn, mittelfrühe Reife
- Sehr niedriger Vicin-/Convicin-Gehalt
- Heller Nabel
- Hohe bis sehr hohe Proteinerträge
- Längerer Typ mit stabiler Standfestigkeit
- Sehr gute offizielle Ergebnisse im europäischen Raum
- Beste Eignung für die Lebensmittelindustrie

# ACKERBOHNE

## Sorteneigenschaften Ackerbohne

| | | |
|---|---|---|
| Tanningehalt | 9 | vorhanden |
| Blühbeginn | 4 | früh - mittel |
| Reife | 5 | mittel |
| Pflanzenlänge | 6 | mittel-lang |
| Neigung zu Lager | 3 | gering |

## Ertragseigenschaften Ackerbohne

| | | |
|---|---|---|
| Tausendkornmasse | 6 | mittel - hoch |
| Kornertrag | 7 | hoch |
| Rohproteingehalt | 4 | gering - mittel |
| Rohproteinertrag | 8 | hoch - sehr hoch |

## Krankheitsanfälligkeit

| | | |
|---|---|---|
| Rost | 5 | mittel |
| Botrytis | 4 | gering bis mittel |

* Einstufung nach BSL 2026

HAUPTSAATEN Seed & Service GmbH | Gaedestraße 9 | 50968 Köln | Tel.: 0221/16381120

Diese Sortenbeschreibung mit den Hinweisen zur Bestandesführung sind auf Basis sorgfältig recherchierter offizieller und firmeninterner Versuchsergebnisse nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Trotzdem hängt der Erfolg der Kultur unter Praxisbedingungen auch von unsererseits nicht beeinflussbaren Faktoren ab, die nichts mit der Qualität und Leistungsfähigkeit der Sorte zu tun zu haben. Eine Gewähr oder Haftung können wir daher nicht übernehmen. Mit Erscheinen dieser Sorten-informationen werden frühere Ausgaben ungültig. **Stand: 10/2026**

# ACKERBOHNE

## Bestandesführung

**Aussaattermin:**




**Aussaat:**

Saatzeit: So früh wie möglich (Befahrbarkeit des Bodens ist entscheidend) Frosttoleranz der Keimpflanze: bis ca. -5°C
Saatstärke je nach Bestellbedingungen

- gut: 45 K/m²
- mittel: 45 – 50 K/m²
- schlecht: 50 – 55 K/m²

Saattiefe:

- leichte Böden 8 – 10 cm
- schwere Böden 6 – 8 cm

**Fungizide:**

- Schokoladenfleckigkeit nach Auftreten.

**Profitipp:**

- Grundsätzlich sollten Ackerbohnen möglichst früh gesät werden. In milden Lagen ist eine Aussaat schon im Februar möglich.
- Ein gut vorbereitetes, abgetrocknetes Saatbett ist aber wichtiger als der früheste Aussaattermin! Bei späteren Aussaaten muss die Saatstärke nicht erhöht werden!
- Für guten Bodenschluss ist zu sorgen um den hohen Keimwasserbedarf zu sichern ggfls. anwalzen.

**Düngung:**

- Eine N-Düngung ist nicht nötig!
- Eine Impfung mit Rhizobien ist nicht notwendig!
- Die Versorgung mit weiteren Grundnährstoffen P2O5, K2O, MgO und S, sollte auf normalen Niveau sein (mittlere Versorgungsstufe).
- Bitte aktuelle Düngeverordnung einhalten.

**Besonderheiten:**

Herbizide:

- Im Vor- und Nachauflauf möglich. Eine mechanische Unkautbekämpfung ist gut möglich.

Insektizide:

- Je nach Befallshöhe und Verwendungsrichtung sind folgende Schädlinge bekämpfungswürdig: Blattrandkäfer (Feldaufgang), schwarze Bohnenblattlaus (Blühbeginn), Ackerbohnenkäfer (Mitte Blüte).

HAUPTSAATEN Seed & Service GmbH | Gaedestraße 9 | 50968 Köln | Tel.: 0221/16381120

Diese Sortenbeschreibung mit den Hinweisen zur Bestandesführung sind auf Basis sorgfältig recherchierter offizieller und firmeninterner Versuchsergebnisse nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Trotzdem hängt der Erfolg der Kultur unter Praxisbedingungen auch von unsererseits nicht beeinflussbaren Faktoren ab, die nichts mit der Qualität und Leistungsfähigkeit der Sorte zu tun zu haben. Eine Gewähr oder Haftung können wir daher nicht übernehmen. Mit Erscheinen dieser Sorten-informationen werden frühere Ausgaben ungültig. **Stand: 10/2026**