

ACKERBOHNE

MYSTIC

DER GEHEIMTIPP ZUM ERFOLG



VICINARM



QUALITÄT



TROCKEN
TOLERANT



ÖKO
EIGNUNG

- Früher Blühbeginn, mittelfrühe Reife
- Hohe Kornerträge
- Sehr niedriger Vicin-/Convicin-Gehalt
- Heller Nabel, ideal für die Lebensmittelindustrie
- Hohe bis sehr hohe Proteinerträge
- Längerer Typ mit mittleren TKM
- Sehr gute offizielle Ergebnisse im europäischen Raum

ACKERBOHNE

Sorteneigenschaften Ackerbohne

Tanningehalt	9	vorhanden
Blühbeginn	4	früh - mittel
Reife	5	mittel
Pflanzenlänge	6	mittel-lang
Neigung zu Lager	3	gering

Ertragseigenschaften Ackerbohne

Tausendkornmasse	6	mittel - hoch
Kornertrag	7	hoch
Rohproteingehalt	4	gering - mittel
Rohproteinertrag	8	hoch - sehr hoch

Krankheitsanfälligkeit

Rost	5	mittel
Botrytis	4	gering bis mittel


* Einstufung nach BSL 2026



ACKERBOHNE

Bestandesführung

Aussaattermin:



Aussaat:

Saatzeit: So früh wie möglich (Befahrbarkeit des Bodens ist entscheidend) Frosttoleranz der Keimpflanze: bis ca. -5°C

Saatstärke je nach Bestellbedingungen

- ☞ gut: 45 K/m²
- ☞ mittel: 45 – 50 K/m²
- ☞ schlecht: 50 – 55 K/m²

Saattiefe:

- ☞ leichte Böden 8 – 10 cm
- ☞ schwere Böden 6 – 8 cm

Fungizide:

- ☞ Schokoladenfleckigkeit nach Auftreten.

Profitipp:

- ☞ Grundsätzlich sollten Ackerbohnen möglichst früh gesät werden. In milden Lagen ist eine Aussaat schon im Februar möglich.
- ☞ Ein gut vorbereitetes, abgetrocknetes Saatbett ist aber wichtiger als der früheste Aussaattermin! Bei späteren Aussaaten muss die Saatstärke nicht erhöht werden!
- ☞ Für guten Bodenschluss ist zu sorgen um den hohen Keimwasserbedarf zu sichern ggfls. anwalzen.

Düngung:

- ☞ Eine N-Düngung ist nicht nötig!
- ☞ Eine Impfung mit Rhizobien ist nicht notwendig!
- ☞ Die Versorgung mit weiteren Grundnährstoffen P₂O₅, K₂O, MgO und S, sollte auf normalen Niveau sein (mittlere Versorgungsstufe).
- ☞ Bitte aktuelle Düngeverordnung einhalten.

Besonderheiten:

Herbizide:

- ☞ Im Vor- und Nachauflauf möglich. Eine mechanische Unkrautbekämpfung ist gut möglich.

Insektizide:

- ☞ Je nach Befallshöhe und Verwendungsrichtung sind folgende Schädlinge bekämpfungswürdig: Blattrandkäfer (Feldaufgang), schwarze Bohnenblattlaus (Blühbeginn), Ackerbohnenkäfer (Mitte Blüte).

