

ACKERBOHNE

TORINA

DER GEHEIMTIPP ZUM ERFOLG



VICINARM



QUALITÄT



ÖKO
EIGNUNG



STANDFEST

- | | |
|--|---|
|  Spitzenerträge auf allen Standorten |  Schnelle Jugendentwicklung |
|  Sehr hohe Proteinerträge |  Gleichmäßige Abreife |
|  Hoher Proteingehalt |  Längerer Typ mit stabiler Standfestigkeit |
|  Sehr niedriger Vicin-/Convicin-Gehalt |  Robuste Grundgesundheit |

Sorteneigenschaften Ackerbohne

Blühbeginn	4	früh - mittel
Reife	5	mittel
Pflanzenlänge	6	mittel-lang
Neigung zu Lager	2	sehr gering bis gering

Ertragseigenschaften Ackerbohne

Tausendkornmasse	6	mittel - hoch
Kornertrag	8	hoch - sehr hoch
Rohproteingehalt	5	mittel
Rohproteinertrag	9	sehr hoch

Krankheitsanfälligkeit


Rost	5	mittel
Botrytis	4	gering bis mittel

* Züchtereigene Einstufung in Anlehnung an das BSA-Schema

ACKERBOHNE

Bestandesführung

Aussaattermin:



Aussaat:

Saatzeit: So früh wie möglich (Befahrbarkeit des Bodens ist entscheidend) Frosttoleranz der Keimpflanze: bis ca. -5°C

Saatstärke je nach Bestellbedingungen

- ☛ gut: 45 K/m²
- ☛ mittel: 45 – 50 K/m²
- ☛ schlecht: 50 – 55 K/m²

Saattiefe:

- ☛ leichte Böden 8 – 10 cm
- ☛ schwere Böden 6 – 8 cm

Fungizide:

- ☛ Schokoladenfleckigkeit nach Auftreten.

Profitipp:

- ☛ Grundsätzlich sollten Ackerbohnen möglichst früh gesät werden. In milden Lagen ist eine Aussaat schon im Februar möglich.
- ☛ Ein gut vorbereitetes, abgetrocknetes Saatbett ist aber wichtiger als der früheste Aussaattermin! Bei späteren Aussaaten muss die Saatstärke nicht erhöht werden!
- ☛ Für guten Bodenschluss ist zu sorgen um den hohen Keimwasserbedarf zu sichern ggfls. anwalzen.

Düngung:

- ☛ Eine N-Düngung ist nicht nötig!
- ☛ Eine Impfung mit Rhizobien ist nicht notwendig!
- ☛ Die Versorgung mit weiteren Grundnährstoffen P₂O₅, K₂O, MgO und S, sollte auf normalen Niveau sein (mittlere Versorgungsstufe).
- ☛ Bitte aktuelle Düngeverordnung einhalten.

Besonderheiten:

Herbizide:

- ☛ Im Vor- und Nachauflauf möglich. Eine mechanische Unkrautbekämpfung ist gut möglich.

Insektizide:

- ☛ Je nach Befallshöhe und Verwendungsrichtung sind folgende Schädlinge bekämpfungswürdig: Blattrandkäfer (Feldaufgang), schwarze Bohnenblattlaus (Blühbeginn), Ackerbohnenkäfer (Mitte Blüte).

