

SOMMERTRITICALE

TOMCAT

DER ÜBERFLIEGER

BIOGAS | STANDFEST | TROCKEN TOLERANT | ÖKO EIGNUNG

- Gute Biogasnutzung dank langem Wuchs, guten Resistenzeigenschaften, top Korn- sowie Biomasseerträge im Zweitfruchtanbau
- Einzigartige Kombination aus Pflanzenlänge und Strohstabilität
- Hervorragend Saatzeitflexibel (Mitte November bis Mitte Juni)
- Sehr gesunde Triticale mit Bestnote 3 in der Fusariumresistenz
- Höchste Rohproteingehalte (APS 8)



SOMMERTRITICALE

Sorteneigenschaften Triticale*

Ährenschieben	6	mittel - spät
Reife	6	mittel-spät
Pflanzenlänge	6	mittel-lang
Neigung zu Lager	3	gering

Krankheitsanfälligkeit*

Mehltau	3	gering
Blattseptoria	3	gering
Gelbrost	4	gering - mittel
Braunrost	2	sehr gering - gering
Ährenfusarium	3	gering

Ertragseigenschaften Triticale*

Kornertrag im Herbstanbau**	8	hoch bis sehr hoch
Bestandesdichte	5	mittel
Kornzahl/Ähre	5	mittel
Tausendkornmasse	5	mittel
Kornertrag Stufe 1	4	gering - mittel
Kornertrag Stufe 2	4	gering - mittel

* Einstufung nach BSL 2026

** Züchtereigene Einstufung in Anlehnung an das BSA-Schema

Bestandesführung

Aussaattermin:

möglich

Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug

optimal

Aussaat:

Je nach Saatzeit/Bestellbedingungen:

- Spätsaat Herbst/Frühjahresaussaat: 320 – 400 K/m²
- Zweitfrucht (Juni/Juli): 420 – 480 K/m²

HAUPTSAATEN Seed & Service GmbH | Gaedestraße 9 | 50968 Köln | Tel.: 0221/16381120

Diese Sortenbeschreibung mit den Hinweisen zur Bestandesführung sind auf Basis sorgfältig recherchierter offizieller und firmeninterner Versuchsergebnisse nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Trotzdem hängt der Erfolg der Kultur unter Praxisbedingungen auch von unsererseits nicht beeinflussbaren Faktoren ab, die nichts mit der Qualität und Leistungsfähigkeit der Sorte zu tun zu haben. Eine Gewähr oder Haftung können wir daher nicht übernehmen. Mit Erscheinen dieser Sorten-informationen werden frühere Ausgaben ungültig. **Stand: 10/2026**



SOMMERTRITICALE

Düngung:

Herbstaussaat

- Bestockung: EC 21/25: 70 – 90 kg/ha N inkl. Nmin
- Schossen: EC 30/32: 40 – 60 kg/ha N
- Spätgabe: EC 39/49: 30 – 40 kg/ha N

Frühjahrsaussaat

- Startgabe: EC 0/13: 70 – 90 kg/ha N inkl. Nmin
- Schossen: EC 30/32: 40 – 60 kg/ha N
- Spätgabe: EC 39/49: 30 – 40 kg/ha N

Bitte aktuelle Düngeverordnung einhalten!

Wachstumsregler-Einsatz:

- Im konventionellen Anbau mit mittlerer bis höherer Stickstoffdüngung sind geringe bis mittlere Aufwandmengen ausreichend
- In sehr trockenen Lagen kann auf den Wachstumsregulator in den meisten Fällen verzichtet werden

Fungizide:

- Eine Blattbehandlung zur Absicherung von Ertrag und Qualität kann sinnvoll sein

HAUPTSAATEN Seed & Service GmbH | Gaedestraße 9 | 50968 Köln | Tel.: 0221/16381120

Diese Sortenbeschreibung mit den Hinweisen zur Bestandesführung sind auf Basis sorgfältig recherchierter offizieller und firmeninterner Versuchsergebnisse nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Trotzdem hängt der Erfolg der Kultur unter Praxisbedingungen auch von unsererseits nicht beeinflussbaren Faktoren ab, die nichts mit der Qualität und Leistungsfähigkeit der Sorte zu tun zu haben. Eine Gewähr oder Haftung können wir daher nicht übernehmen. Mit Erscheinen dieser Sorten-informationen werden frühere Ausgaben ungültig. **Stand: 10/2026**



SOMMERTRITICALE

HAUPTSAATEN Seed & Service GmbH | Gaedestraße 9 | 50968 Köln | Tel.: 0221/16381120

Diese Sortenbeschreibung mit den Hinweisen zur Bestandesführung sind auf Basis sorgfältig recherchierter offizieller und firmeninterner Versuchsergebnisse nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Trotzdem hängt der Erfolg der Kultur unter Praxisbedingungen auch von unsererseits nicht beeinflussbaren Faktoren ab, die nichts mit der Qualität und Leistungsfähigkeit der Sorte zu tun zu haben. Eine Gewähr oder Haftung können wir daher nicht übernehmen. Mit Erscheinen dieser Sorten-informationen werden frühere Ausgaben ungültig. **Stand: 10/2026**