ACKERBOHNE

CAPRICE

TOPERTRAG FÜR GUTE LAUNE

QUALITÄT | STANDFEST | TROCKEN TOLERANT | ÖKO EIGNUNG

- Hohe bis sehr hohe Ertragsleistung
- Sehr hohe Proteinerträge, ideal auch für hofeigenes Futter
- Rasche Jugendentwicklung und schnelle Bodenbedeckung
- Längerer aber sehr standfester Typ
- Gesund mit geringer Neigung zum Platzen der Hülsen
- Neue Ackerbohnengenetik mit verbessertem Ertrag und hoher Qualität

Sorteneigenschaften Ackerbohne*		
Tanningehalt	9	vorhanden
Blühbeginn	4	früh - mittel
Reife	5	mittel
Pflanzenlänge	6	mittel-lang
Neigung zu Lager	3	gering

Ertragseigenschaften Ackerbohne*		
Tausendkornmasse	6	mittel - hoch
Kornertrag	6	mittel - hoch
Rohproteingehalt	5	mittel
Rohproteinertrag	8	hoch - sehr hoch

Krankheitsanfälligkeit*		
Rost	5	mittel
Botrytis	4	gering bis mittel
Ascochyta	5	mittel

* Einstufung nach BSL 2025

CAPRICE

Bestandesführung

Aussaattermin:

möglich

Jan | Feb | Mär | Apr | Mai

optimal

Aussaat:

Saatzeit: So früh wie möglich (Befahrbarkeit des Bodens ist entscheidend) Frosttoleranz der Keimpflanze: bis ca. -5°C

Saatstärke je nach Bestellbedingungen

- gut: 45 K/m²
- mittel: 45 – 50 K/m²
- schlecht: 50 – 55 K/m²

Saattiefe:

- leichte Böden 8 – 10 cm
- schwere Böden 6 – 8 cm

Fungizide:

- Schokoladenfleckigkeit nach Auftreten.

Profitipp:

- Grundsätzlich sollten Ackerbohnen möglichst früh gesät werden. In milden Lagen ist eine Aussaat schon im Februar möglich.
- Ein gut vorbereitetes, abgetrocknetes Saatbett ist aber wichtiger als der früheste Aussaattermin! Bei späteren Aussaaten muss die Saatstärke nicht erhöht werden!
- Für guten Bodenschluss ist zu sorgen um den hohen Keimwasserbedarf zu sichern ggfls. anwalzen.

Düngung:

- Eine N-Düngung ist nicht nötig!
- Eine Impfung mit Rhizobien ist nicht notwendig!
- Die Versorgung mit weiteren Grundnährstoffen P2O5, K2O, MgO und S, sollte auf normalen Niveau sein (mittlere Versorgungsstufe).
- Bitte aktuelle Düngeverordnung einhalten.

Besonderheiten:

Herbizide:

- Im Vor- und Nachauflauf möglich. Eine mechanische Unkautbekämpfung ist gut möglich.

Insektizide:

- Je nach Befallshöhe und Verwendungsrichtung sind folgende Schädlinge bekämpfungswürdig: Blattrandkäfer (Feldaufgang), schwarze Bohnenblattlaus (Blühbeginn), Ackerbohnenkäfer (Mitte Blüte).

HAUPTSAATEN Seed & Service GmbH | Gaedestraße 9 | 50968 Köln | Tel.: 0221/16381120

Diese Sortenbeschreibung mit den Hinweisen zur Bestandesführung sind auf Basis sorgfältig recherchierter offizieller und firmeninterner Versuchsergebnisse nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Trotzdem hängt der Erfolg der Kultur unter Praxisbedingungen auch von unsererseits nicht beeinflussbaren Faktoren ab, die nichts mit der Qualität und Leistungsfähigkeit der Sorte zu tun zu haben. Eine Gewähr oder Haftung können wir daher nicht übernehmen.
Mit Erscheinen dieser Sorten-informationen werden frühere Ausgaben ungültig. **Stand: 10/2025**